

99年度社區藥局用藥照護 個案報告

第一組 心中外藥局 邱振源藥師

- 張女士，80歲 20091208入住機構
- 病史與主述：
 - 1. 高血壓，糖尿病十多年
 - 2. 痔瘡約七-八年
 - 3. 四年前大腦右邊動脈梗塞(伴有腦梗塞之腦動脈阻塞)
 - 4. 長期臥床，常腹脹及便秘

藥師訪視時間 990122

- DUPHALAC 10C.C. TID
- PREVOMIC 1# TID
- MGO 2# BID
- DULCOLAX 2# QN
- KASCOAL 40MG 1# TID
- STROCAINE 1# TID
- CARTIL 60MG 1.5# TID
- ESPIN 1# QD
- ACERTIL 4MG 1# BID
- NOOTROPIL 1200MG 1# QD
- XYLMOL OINTMENT PRN
- 新表飛鳴 3# BID
- 銀寶善存 0.5# BID

Magic Runtime

File Edit Options View Tools Help 1.調劑暨申報

諮詢藥師建議表維護作業

客戶代號: A201509 床號: 5-2 年齡: 80 性別: 女

建議日期	單號	藥師代號	姓名	建議對象	醫院代號	對象代號	姓名	建議結果	回覆	追蹤	結案
01/22/2010	01	F123618686	邱振源	2 護士		F123618686	邱振源	Y.接受			Y
01/22/2010	02	F123618686	邱振源	1 醫師	1131010011	F123618686	邱振源	Y.接受			Y

獲得藥物治療問題的來源: 藥師親自到訪 電話 E-Mail 傳真

藥物治療問題	禁忌症或注意事項	問題敘述(列出處方日期/所使用藥物、說明藥物治療問題)
C		ESPIN打開膠囊且磨粉
I	交互作用	ESPIN與MGO, STROCAIN同時服用

建議內容	敘述
01 劑量或用法調整	MGO, STROCAIN使胃中PH值升高使ESPIN提早於胃中釋放, 建議分開服用。
08 不可磨粉	ESPIN為enteric coated劑型, 藥品本身對胃的刺激性大故製成腸溶衣顆粒, 磨粉後破壞腸式造成胃刺激, 建議勿磨粉。

參考資料: 仿單 藥品手冊 參考書籍(或文獻)

le: 長照系統6 DR 修改 OVR

下午 06:36

Magic Runtime
File Edit Options View Tools Help 1.調劑暨申報

諮詢藥師建議表維護作業

客戶代號: A2014... 床號: 5-2 年齡: 80 性別: 女

建議日期	單號	藥師代號	姓名	建議對象	醫院代號	對象代號	姓名	建議結果	回覆	追蹤	結案
01/22/2010	01	F123618686	邱振源	2 護士		F123618686	邱振源	Y.接受			Y
01/22/2010	02	F123618686	邱振源	1 醫師	1131010011	F123618686	邱振源	Y.接受			Y

獲得藥物治療問題的來源: 藥師親自到訪 電話 E-Mail 傳真

藥物治療問題	問題敘述(列出處方日期/所使用藥物、說明藥物治療問題)
C 禁忌症或注意事項	DULCOLAX磨粉

建議內容	敘述
08 不可磨粉	DULCOLAX為腸溶錠不建議磨粉,建議改為SENNOSIDE

參考資料: 仿單 藥品手冊 參考書籍(或文獻)

DR 修改 OVR

le: 長照系統6

下午 06:43

Magic Runtime
File Edit Options View Tools Help 1.調劑暨申報

諮詢藥師建議表維護作業

客戶代號: A2014... 床號: 5-2 年齡: 80 性別: 女

建議日期	單號	藥師代號	姓名	建議對象	醫院代號	對象代號	姓名	建議結果	回覆	追蹤	結案
01/22/2010	01	F123618686	邱振源	2 護士		F123618686	邱振源	Y.接受			Y
01/22/2010	02	F123618686	邱振源	1 醫師	1131010011	F123618686	邱振源	Y.接受			Y
01/22/2010	03	F123618686	邱振源	2 護士		F123618686	邱振源	Y.接受			N

獲得藥物治療問題的來源: 藥師親自到訪 電話 E-Mail 傳真

藥物治療問題	問題敘述(列出處方日期/所使用藥物、說明藥物治療問題)
B 有疾病未治療	2006/11/02出院病歷摘要有DM病史

建議內容	敘述
07 監測血糖值	有DM病史確無開藥? (查看入住後12月及1月的血糖值 <AC 88-110mg/dl>, 詢問照顧護士表示:醫師沒

參考資料: 仿單 藥品手冊 參考書籍(或文獻)

DR 修改 INS

le: 長照系統6

下午 07:47

Magic Runtime
File Edit Options View Tools Help 1.調劑暨申報

諮詢藥師建議表維護作業

客戶代號: A201409 床號: 5-2 年齡: 80 性別: 女

建議日期	單號	藥師代號	姓名	建議對象	醫院代號	對象代號	姓名	建議結果	回覆	追蹤	結案
01/22/2010	04	F123618686	邱振源	2 護士		F123618686	邱振源	Y.接受			N

獲得藥物治療問題的來源: 藥師親自到訪 電話 E-Mail 傳真

藥物治療問題	問題敘述(列出處方日期/所使用藥物、說明藥物治療問題)
C 禁忌症或注意事項	ACERTIL 4MG 1# BID

建議內容	敘述
05 注意發生副作用	血管張力素轉換酶抑制劑(ACEI) 易引起咳嗽副作用, 請多觀察病人狀況。

參考資料: 仿單 藥品手冊 參考書籍(或文獻)

DR [] 修改 INS

開始 2 MGrntw 11 PCho... Microsoft... 2 Interne... CH 下午 07:55

Magic Runtime
File Edit Options View Tools Help 1.調劑暨申報

諮詢藥師建議表維護作業

客戶代號: A201409 床號: 5-2 年齡: 80 性別: 女

建議日期	單號	藥師代號	姓名	建議對象	醫院代號	對象代號	姓名	建議結果	回覆	追蹤	結案
01/22/2010	05	F123618686	邱振源	2 護士		F123618686	邱振源	Y.接受			N

獲得藥物治療問題的來源: 藥師親自到訪 電話 E-Mail 傳真

藥物治療問題	問題敘述(列出處方日期/所使用藥物、說明藥物治療問題)
I 交互作用	併用ESPIN及ACERTIL

建議內容	敘述
09 監測血壓值	注意血壓數值。
10 其它	aspirin抑制前列腺素的生成, 會降低ACEI的降壓及血管擴張作用。建議併用ACEI及salicylates時, 當病患血壓異常, 建議以ARB替代ACEI。

參考資料: 仿單 藥品手冊 參考書籍(或文獻) 行政院衛生署藥品交互作用資料庫查詢系統

DR [] 修改 INS

開始 2 MGrntw 11 PCho... Microsoft... 2 Interne... CH 下午 08:11

藥師訪視時間 990224

- DUPHALAC 10C.C. TID
- PREVOMIC 1# TID
- MGO 2# TID
- ★DULCOLAX 2# TID
- KASCOAL 40MG 1# TID
- STROCAINE 1# TID
- CARTIL 60MG 1.5# TID
- ESPIN 1# QD
- ACERTIL 4MG 1# BID
- NOOTROPIL 1200MG 1# QD
- XYLMOL OINTMENT PRN
- ★HEMATONIC 1# BID
- 新表飛鳴 3# BID
- 銀寶善存 0.5# BID
- ★2/21-2/24 李時珍四物鐵 1瓶 QD

- 2/19由家屬陪同至亞東醫院血液腫瘤科就診，診斷為缺鐵性貧血，且糞便潛血反應為+3。家屬有詢問是否需輸血治療，醫師表示因個案為長期臥床病患，耗氧量少，故暫不需輸血，可先安排大腸鏡檢查找出出血原因，但因家屬表示個案年紀大，而拒絕做大腸鏡檢查。醫師開立 **HEMATONIC 1# BID**。

- 血紅素值則沿用世界衛生組織建議之貧血診斷標準：
6個月以上嬰兒至6歲兒童採 < 11公克/100毫升
6~14歲兒童採 < 12公克/毫升
成年男子採 < 13公克/100毫升
成年女子採 < 12公克/100毫升
孕婦採 < 11公克/100毫升
- 男性為380萬~600萬個/mm³
女性為380萬~550萬個/mm³
- 血色素《Hb》—男性：12~18g/dl
女性：11.5~18g/dl
- 血球容積比《Ht》—男性：36~50%
女性：34~47%

	971023	980123	980731	980312	990127	990211	990311	990426
RBC	4.93	4.29	4.02	3.91	3.65	3.33	3.57	3.13
HB	13.3	13.3	10.7	8.2	8.0	7.3	8.4	9.3
HCT			32.4		26.2	23.4	26.8	

2/11-2/19
BP:108-132/74-80mmHG
HR:67-71次/分

Magic Runtime

File Edit Options View Tools Help 1.調劑暨申報

請詢藥師建議表維護作業

客戶代號: A2014... 9... 床號: 5-2 年齡: 80 性別: 女

建議日期	單號	藥師代號	姓名	建議對象	醫院代號	對象代號	姓名	建議結果	回覆	追蹤	結案
02/24/2010	01	F123618686	邱振源	2 護士		F123618686	邱振源	Y.接受			N

獲得藥物治療問題的來源: 藥師親自到訪 電話 E-Mail 傳真

藥物治療問題

其它:	問題敘述(列出處方日期/所使用藥物、說明藥物治療問題)
P	食用四物鐵每天1瓶

建議內容

其它	敘述
10	建議停止食用四物鐵飲品 1.牙齦日漸浮腫,經牙醫師診斷為上火 2.鐵質攝取量已足夠

參考資料: 仿單 藥品手冊 參考書籍(或文獻)

DR: [] 修改

開始 2 MGrntw PCho... Microsoft... 2 Internet... 下午 09:16

李時珍四物鐵-鐵定美歸!!! - Windows Internet Explorer

http://www.herbiron.com.tw/index.html

檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

我的最愛 Facebook 歡迎來到 Facebook Facebook 首頁 [解除] http://tw.wrs.yahoo.com/~yjt=... 全國藥師論壇 醫聲論壇

HEMATONIC - Yahoo... 李時珍本草屋 李時珍四物鐵...

李時珍本草屋

超好喝的!

開心30分鐘 普部曲

購買去

李時珍四物鐵

本草養生·國家認證 全國第1瓶國家認證四物飲品

產品特性:

結合女性聖品"四物萃取精華"與專利"甘胺酸亞鐵",可幫助鐵質吸收、有效補充鐵質。最值得一提的是,它完全沒有濃厚的四物味道,口感像極了酸梅湯,讓人不用捏著鼻子猛灌,讓您同時擁有好氣色,也擁有好心情。

適用對象:

12歲以上女性,經期間請勿食用。

建議用量:

每日1瓶。

產品規格:

50毫升/瓶

經動物實驗證實具有以下保健功效:

有助於促進鐵吸收
有助於增加血紅素生成

Blog Plurk

四物鐵 李時珍四物鐵 產品介紹 健康小教室 見證分享 四物鐵下載

Magi Runtime - Microso... 李時珍四物鐵-鐵... 下午 09:03

- 四物湯是由當歸、川芎、熟地、白芍四味藥，依一定比例所組合而成。主要作用是「補養肝血」。所以體質是屬於「肝血不足」的人，才適合服用。而肝血不足臨床上的表現為面色萎黃、爪甲色淡、頭暈眼花、手足麻木、易抽筋、月經量少、顏色淡紅、質地清稀如水等症狀。而現代人因為工作忙碌壓力大，生活作息不規律，再加上不良的飲食習慣—喜好燒烤炸辣，高粱厚味吃太多，導致燥熱體質偏多，所以大部分的人都不適合吃單純的四物湯。
- 屬於燥熱體質的人，吃了四物湯會出現口乾舌燥、便秘、長痘痘等上火的症狀。

表二：在一般老年人應減少劑量，服用頻次或減短治療期間的不適當藥物

藥物(種類)	不適當理由
★鐵劑補充藥物(Iron supplements)每日不宜使用超過 325mg	給予高劑量鐵劑，吸收總量並未隨之增加，反而可能造成便秘
毛地黃(Digoxin)	老年人或腎功能不全者應減少劑量
具強烈抗膽鹼作用之抗組織胺，如 hydroxyzine, cyproheptadine, chlorpheniramine, diphenhydramine	具強烈抗膽鹼副作用，故儘可能避免使用或減低劑量
短效 Benzodiazepine 等藥物，如 lorazepam(Ativan), oxazepam(Serenal), alprozolam(Xanax), zolpidem (Stilnox)	老年人會增加藥物敏感度，低劑量下即有效且安全

(資料來源：Am Fam Physician 2002;66:1917-24, CMAJ 1997;156:385-91., Arch Intern Med 1991;151:1825-32., 1997;157:1531-6.)

鐵劑補充劑量

■ Hematonic 每顆含量

Ferrous fumarate 152.1 mg (equiv to 50 mg elemental Fe),
 Ascorbic acid 250 mg, Thiamine mononitrate 3 mg,
 Riboflavin 3 mg, Pyridoxine HCl 2.5 mg,
 Cyanocobalamin 12.5 mcg, Folic acid 0.5 mg,
 Niacinamide 15 mg, Ca pantothenate 5 mg,
 Alpha tocopheryl acetate 15 iu, Dioctyl Na sulfosuccinate 25 mg

■ 銀寶善存 每顆含量

Ferrous fumarate 9mg

■ 四物鐵 每瓶含量

甘胺酸亞鐵 37.5-62.5mg

Magic Runtime
 File Edit Options View Tools Help 1.調劑暨申報

諮詢藥師建議表維護作業

客戶代號: A2014009 床號: 5-2 年齡: 80 性別: 女

建議日期	單號	藥師代號	姓名	建議對象	醫院代號	對象代號	姓名	建議結果	回覆	追蹤	結案
02/24/2010	02	F123618686	邱振源	2 護士		F123618686	邱振源	Y.接受			N

獲得藥物治療問題的來源: 藥師親自到訪 電話 E-Mail 傳真

藥物治療問題	問題敘述(列出處方日期/所使用藥物、說明藥物治療問題)
I 交互作用	鐵劑與牛奶併服

建議內容	敘述
01 劑量或用法調整	牛奶裡的鈣和磷酸鹽，會妨礙鐵的吸收。 建議隔開2小時服用。

參考資料: 仿單 藥品手冊
 參考書籍(或文獻)

DR [] 修改

le: 長照系統6

下午 09:55

Magic Runtime

File Edit Options View Tools Help 1.調劑暨申報

請詢藥師建議表維護作業

客戶代號: A201409 床號: 5-2 年齡: 80 性別: 女

建議日期	單號	藥師代號	姓名	建議對象	醫院代號	對象代號	姓名	建議結果	回復	追蹤	結案
02/24/2010	03	F123618686	邱振源	2 護士		F123618686	邱振源	X.其它			N

獲得藥物治療問題的來源: 藥師親自到訪 電話 E-Mail 傳真

藥物治療問題	問題敘述(列出處方日期/所使用藥物、說明藥物治療問題)
G	重複同藥理作用藥品 DULCOLAX 2# TID+DUPHALAC 10ml TID+MGO 2# BID

建議內容	敘述
10	其它 是否病人便秘情形加重?
01	劑量或用法調整 (3月初巡診醫師表示病人便秘情形改善很多, DULCOLAX跟DUPHALAC先 HOLD住暫不需給藥。)

參考資料: 仿單 藥品手冊 參考書籍(或文獻)

DR: [] 修改

系統: 長照系統6

下午 10:14

藥師訪視時間 990331

- DUPHALAC 10C.C. TID
- PREVOMIC 1# TID
- MGO 2# TID
- DULCOLAX 2# TID
- KASCOAL 40MG 1# TID
- STROCAINE 1# TID
- CARTIL 60MG 1.5# TID
- ESPIN 1# QD
- ACERTIL 4MG 1# BID
- NOOTROPIL 1200MG 1# QD
- XYLMOL OINTMENT PRN
- HEMATONIC 1# BID
- 新表飛鳴 3# BID
- 銀寶善存 0.5# BID
- ★(3月初)三多膳食纖維 10克 QD

營養評估

日期	1/21	2/22	3/31	4/28
奶粉種類	益力壯 高氮 U-101	益力壯 高氮 U-101	皇家健康 U-101	皇家健康 U-101

藥師訪視時間 990429

- DUPHALAC 10C.C. TID
- PREVOMIC 1# TID
- MGO 2# TID
- DULCOLAX 2# TID
- KASCOAL 40MG 1# TID
- STROCAINE 1# TID
- CARTIL 60MG 1.5# TID
- ESPIN 1# QD
- ACERTIL 4MG 1# BID
- NOOTROPIL 1200MG 1# QD
- XYLMOL OINTMENT PRN
- HEMATONIC 1# BID
- 新表飛鳴 3# BID
- 銀寶善存 0.5# BID
- 三多膳食纖維 10克 QD

身高154CM 理想體重54KG

日期	1/21	2/22	3/31	4/28
體重	48.2	47	46.3	46
BMI	20.3		19.2	
營養師 建議的 熱量需求	1200卡	1200卡	1200卡	1400卡

3/31更換牛奶配方之後，脹氣及便秘情形改善，但因體重偏輕，營養師拉高奶粉份量以增加其熱量需求。

Magic Runtime
File Edit Options View Tools Help 1.調劑暨申報

諮詢藥師建議表維護作業

客戶代號: A2014099 床號: 5-2 年齡: 80 性別: 女

建議日期	單號	藥師代號	姓名	建議對象	醫院代號	對象代號	姓名	建議結果	回覆	追蹤	結案
04/29/2010	01	F123618686	邱振源	1 醫師	1131010011	1131010011	林政寬				N

獲得藥物治療問題的來源: 藥師親自到訪 電話 E-Mail 傳真

藥物治療問題	問題敘述(列出處方日期/所使用藥物、說明藥物治療問題)
A 無適應症	3/31營養師更換牛奶配方之後，已無脹氣情形。

建議內容	敘述
01 劑量或用法調整	是否可考慮停用KASCOAL

參考資料: 仿單 藥品手冊 參考書籍(或文獻)

DR: [] 增加

系統: 長照系統6 下午 10:47

990504用藥

- ★PROMERAN 1# TID
- ★KASCOAL 50MG 1# TID
- ★MGO 2# TID
- ★MAGOCAIN 1# TID
- CARTIL 60MG 1.5# TID
- ESPIN 1# QD
- ACERTIL 4MG 1# BID
- NOOTROPIL 1200MG 1# QD
- XYLMOL OINTMENT PRN
- HEMATONIC 1# BID
- 新表飛鳴 3# BID
- 銀寶善存 0.5# BID
- 三多膳食纖維 10克 QD

今日分享

- 管灌病人的用藥特殊性
- 藥品與保健食品的搭配服用問題
(HEMATONIC跟四物鐵及銀保善存)
(DULCOLAX, MGO, DUPHALAC與膳食纖維)
- 病人有某方面病史就需對該疾病的生化數值及生理狀況多加注意
(DM卻無開藥)
(痔瘡引起貧血)
- 經由營養師的專業評估來達到減少藥品的服用

參考資料

- 行政院衛生署食品資訊網
- 行政院衛生署藥品交互作用資料庫查詢系統
- 台大醫院健康教育知識庫
- http://www.chimei.org.tw/main/right/right01/cmh_department/57100/NEWS03.htm

