

副本

檔 號：  
保存年限：

## 行政院衛生署中央健康保險局 書函

地址：台北市信義路3段140號

傳真：(02)27026324

聯絡人及電話：張靜嘉(02)27065866轉2633

10452

台北市民權東路1段67號5樓

受文者：中華民國藥師公會全國聯合會

發文日期：中華民國101年3月15日

發文字號：健保審字第1010074993A號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：發布令稿含「全民健康保險藥品給付規定—第7章 腸胃藥物 Gastrointestinal drugs 7.2. 止吐劑 Antiemetic drugs」規定電子檔、發布令掃描檔、法規及行政規則刊登行政院公報資料提要表電子檔

主旨：「全民健康保險藥品給付規定—第7章 腸胃藥物 Gastrointestinal drugs 7.2. 止吐劑 Antiemetic drugs」，業經本局於中華民國101年3月15日以健保審字第1010074993號令修正發布，茲檢送發布令（含附件）各1份，請查照。

說明：併附法規及行政規則刊登行政院公報資料提要表1份。

正本：行政院公報編印中心（請刊登公報）

副本：行政院法規委員會、行政院衛生署法規委員會、行政院衛生署醫事處、行政院衛生署全民健康保險小組、行政院衛生署食品藥物管理局、全民健康保險監理委員會、全民健康保險爭議審議委員會、行政院衛生署醫院管理委員會、台北市政府衛生局、高雄市政府衛生局、行政院國軍退除役官兵輔導委員會、國防部軍醫局、福建省連江縣政府、福建省金門縣政府、台灣醫學資訊學會、台北市電腦商業同業公會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國牙醫師公會全國聯合會、中華民國基層醫師協會、中華民國基層醫療協會、中華民國藥師公會全國聯合會、中華民國藥劑生公會全國聯合會、中華民國開發性製藥研究協會、中華民國藥品行銷暨管理協會、台灣區製藥工業同業公會、中華民國製藥發展協會、台北市西藥代理商業同業公會、中華民國西藥商業同業公會全國聯合會、中華民國西藥代理商業同業公會、台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣教會醫療院所協會、本局資訊組（請刊登本局全球資訊網）、本局企劃組（請刊登健保電子報）、本局醫務管理組、本局各分區業務組（請轉知轄區醫事機構）（以上均含附件）

行政院衛生署中央  
健康保險局檢討室(3)

# 行政院衛生署中央健康保險局



「全民健康保險藥品給付規定」修正規定

第7章 腸胃藥物 Gastrointestinal drugs

7.2. 止吐劑 Antiemetic drugs

(自 101 年 4 月 1 日生效)

修正後給付規定	原給付規定
7.2.1. Serotonin antagonists (如 ondansetron、graniisetron、tropisetron、ramosetron、palonosetron 等) (93/2/1、93/9/1、98/9/1、99/5/1、 <u>101/4/1</u> )	7.2.1. Serotonin antagonists (如 ondansetron、graniisetron、tropisetron、ramosetron、palonosetron 等) (93/2/1、93/9/1、98/9/1、99/5/1)
1. (略)	1. (略)
2. (略)	2. (略)
3. (略)	3. (略)
<u>備註：(刪除)(101/4/1)</u>	<u>備註：</u> <u>高致吐性藥品：</u> <u>cisplatin (&gt;50mg/m<sup>2</sup>/day), carmustine (≥ 250mg/m<sup>2</sup> /day), cyclophosphamide (&gt;1500mg/m<sup>2</sup>/day), methotrexate (≥ 1. 2gm/m<sup>2</sup>/day)。</u> <u>中致吐性藥品：</u> <u>cisplatin (≥ 30mg/m<sup>2</sup>/day, ≤ 50mg/m<sup>2</sup>/day), carmustine (&lt;250mg/m<sup>2</sup>/day), Cyclophosphamide (≤ 1500mg/m<sup>2</sup> /day), doxorubicin (≥ 45mg/m<sup>2</sup>/day), epirubicin (≥ 70mg/m<sup>2</sup>/day), CPT-11, idarubicin</u>

	( $\geq 10\text{mg}/\text{m}^2/\text{day}$ ) , daunorubicin ( $\geq 60\text{mg}/\text{m}^2/\text{day}$ ) , dactinomycin (actinomycin-D) , arsenic trioxide , melphalan ( $\geq$ $50\text{mg}/\text{m}^2/\text{day}$ ) , cytarabine , carboplatin , oxaliplatin , ifosfamide , mitoxantrone , dacarbazine 且其使用劑量為一般 公認治療劑量或上述規定劑量時。
7.2.2. Neurokinin-1 receptor antagonist (如 aprepitant) (94/10/1、101/02/1、 <u>101/4/1</u> )	7.2.2. Neurokinin-1 receptor antagonist (如 aprepitant) (94/10/1、101/02/1)
1. 與其他止吐藥劑併用，以防止由高致 吐性癌症化療藥物在初次或重覆使 用時所引起的急性或延遲性噁心與 嘔吐。(101/2/1)	1. 與其他止吐藥劑併用，以防止由高致 吐性癌症化療藥物在初次或重覆使 用時所引起的急性或延遲性噁心與 嘔吐。(101/2/1)
2. 限用三天， <u>每日限用一顆</u> ，除第一天 外，不得併用 5-HT3 之藥物。 (101/4/1)	2. 限用三天，除第一天外，不得併用 5-HT3 之藥物。
3. (刪除) (101/4/1)	3. <u>aprepitant 使用劑量如下：</u> <u>高致吐性藥品化療前 125mg</u> ， <u>第二天及第三天 80mg</u> 。(101/2/1)
備註：	備註：
1. 高致吐性藥物： cisplatin (>50mg/ $\text{m}^2/\text{day}$ )、 carmustine ( $\geq 250\text{mg}/\text{m}^2/\text{day}$ )、 cyclophosphamide (>1500mg/ $\text{m}^2/\text{day}$ )、 methotrexate ( $\geq$	高致吐性藥物： cisplatin (>50mg/ $\text{m}^2/\text{day}$ )， carmustine ( $\geq 250\text{mg}/\text{m}^2/\text{day}$ )， cyclophosphamide (>1500mg/ $\text{m}^2/\text{day}$ )， methotrexate ( $\geq 1.2\text{gm}/\text{m}^2/\text{day}$ )，中致吐劑量之

<p>1. <math>2\text{gm}/\text{m}^2/\text{day}</math>)、中致吐劑量之 anthracycline 藥物合併另一中致吐性藥物。(101/02/1、101/4/1)</p> <p>2. <u>中致吐性藥品</u>：(101/4/1)  <u>cisplatin</u> (<math>\geq 30\text{mg}/\text{m}^2/\text{day}</math>, <math>\leq 50\text{mg}/\text{m}^2/\text{day}</math>)、<u>carmustine</u> (<math>&lt; 250\text{mg}/\text{m}^2/\text{day}</math>)、<u>cyclophosphamide</u> (<math>\leq 1500\text{mg}/\text{m}^2/\text{day}</math>)、<u>doxorubicin</u> (<math>\geq 45\text{mg}/\text{m}^2/\text{day}</math>)、<u>epirubicin</u> (<math>\geq 70\text{mg}/\text{m}^2/\text{day}</math>)、<u>irinotecan</u>、<u>idarubicin</u> (<math>\geq 10\text{mg}/\text{m}^2/\text{day}</math>)、<u>daunorubicin</u> (<math>\geq 60\text{mg}/\text{m}^2/\text{day}</math>)、<u>dactinomycin</u> (<u>actinomycin-D</u>)、<u>arsenic trioxide</u>、<u>melphalan</u> (<math>\geq 50\text{mg}/\text{m}^2/\text{day}</math>)、<u>cytarabine</u>、<u>carboplatin</u>、<u>oxaliplatin</u>、<u>ifosfamide</u>、<u>mitoxantrone</u>，<u>dacarbazine</u> 且其使用劑量為一般公認治療劑量或上述規定劑量時。</p>	<p>anthracycline 藥物合併另一中致吐性藥物使用者。(101/02/1)</p>
--	---


※劃線部分為新修正之規定



檔 號：  
保存年限：

行政院衛生署中央健康保險局 令

發文日期：中華民國101年3月15日  
發文字號：健保審字第1010074993號  
附件：給付規定修正對照表



修正「全民健康保險藥品給付規定—第7章 腸胃藥物  
Gastrointestinal drugs 7.2. 止吐劑 Antiemetic  
drugs」給付規定，並自中華民國一百零一年四月一日生  
效。

附修正「全民健康保險藥品給付規定—第7章 腸胃藥物  
Gastrointestinal drugs 7.2. 止吐劑 Antiemetic  
drugs」給付規定

行政院衛生署中央  
健康保險局

局長 戴桂英

