

99年度社區藥局用藥照護個案告

華特藥局
劉宗翰藥師

個案基本資料

林女士 77歲

可自主活動並與先生兒子同住 2009/05/13
在本藥局領藥至今

病史與主述：

1. 高血壓10年
2. 白內障3年
3. 女性更年期之病態
4. 慢性過敏性結膜炎
5. 慢性支氣管炎

藥師訪視時間 990720

▪ Sectral 400mg tab	1#	QDPC	28粒
▪ Estromon 0.625mg FC tab	1#	QDPC	28粒
▪ Quinax 15ml oph sol	1d	TIDE EY	1瓶
▪ Flurbi pap 40mg/Patch	1#	QID TD	12片
▪ Aprovel 150mg tab	1#	QDPC	28粒
▪ Sinomin 4% 15ml oph	1d	QID OU	1瓶
▪ 葉黃素	2#	QD	
▪ Glucosamin複方錠	1#	BID	
▪ 綜合維他命	1#	QD	

病人主訴

- ✓ 這次服用aprovel 150mg降血壓藥身體感到不適,產生咳嗽痰液變多.胸悶.頭痛
- ✓ 和上次處分比對上次醫師開立
co-diovan80/12.5mg病人沒有反應不良作用
- ✓ 病人要求是否可以換成co-diovan80/12.5mg

藥師處置

- ◆經和病人溝通解釋換藥必須由醫師更改處方才可以換藥
- ◆咳嗽,痰液變多的部分,可以喝水潤滑改善
- ◆和病人詳談才知原本家醫科主治醫師休假,由另一位醫師替代看診再沒告知之下換藥
- ◆病人同時服用葉黃素,Glucosamin複方錠及維他命經建議與處方用藥分隔1-2小服用

心臟血管系統用藥 / 抗高血壓劑

藥名(學名) : IRBESARTAN 商品名(廠商) :
APROVEL(Sanofi)

成份 : 每錠含75mg, 150mg, 300mg。

藥物作用 : 選擇性的阻斷血管緊縮素 I I 結合到很多組織(如血管的平滑肌、腎上腺)的 A T 的接受體, 因此阻斷血管緊縮素 I I 的血管收縮與醛類魯醇分泌作用產生降壓作用。

藥物動力學 :

吸收 : 由胃腸道迅速吸收 ;

蛋白結合率 : 90% ;

半衰期 : 11~15小時 ;

代謝 : 肝 ; 排泄 : 80%由糞便。

治療項目 : 高血壓。(未標示之用途)充血性心衰竭。

用法用量 : 口服 每天1次150mg開始,可增加至1天300mg。

- 副作用：**
- (1) 全身：水腫，疲勞，疼痛。手腳或關節腫脹
 - (2) 中樞神經：眩暈，頭痛，焦慮，神經過敏。
 - (3) 心血管：心博過速，胸痛。
 - (4) 胃腸：下痢，消化不良，噁心，嘔吐，腹痛。
 - (5) 呼吸：上呼吸道感染，咳嗽，竇障礙，咽炎，鼻炎。
 - (6) 皮膚：發疹。
 - (7) 其他：泌尿道感染。

- 注意事項：**
- (1) 為防止低血壓，在開始治療前需先矯正容積缺乏。
 - (2) 每日劑量可高至300mg，更大的劑量無法提供添加的效益。
 - (3) 由減低舒張及收縮壓顯現治療效用。
 - (4) 定期監測血壓可能的話在下個預定劑量前實施。
 - (5) 定期監測血中尿素氮和肌酸酐、血清鉀、完全血球分類計數。
 - (6) 女性懷孕時應立即通知醫師。
 - (7) 最大降壓效力要6~12週才顯現。
 - (8) 曾有眩暈發生的報告，尤其是當姿勢改變時。

使用禁忌：對本劑，losartan或valsartan過敏者，懷孕，授乳

藥師訪視時間 990820

◆ Sectral 400mg tab	1#	QDPC	28粒
◆ Estromon 0.625mg FC tab	1#	QDPC	28粒
◆ Quinax 15ml oph sol	1d	TIDE EY	1瓶
◆ Flurbi pap 40mg/Patch	1#	QID TD	12片
◆ Sinomin 4% 15ml oph	1d	QID OU	1瓶
◆ Co-diovan 80/12.5 FC tab	1#	QDPC	28粒
◆ Bisovan 8mg	1#	Tidpc	84粒
◆ 葉黃素	2#	QD	
◆ Glucosamin複方錠	1#	BID	
◆ 綜合維他命	1#	QD	

交互作用 / 藥力重複比較

步驟4. 待查藥品清單：

A028451100 BISOLVON TABLETS 8MG (BROMHEXINE HYDROCHLORIDE) (氣舒痰錠8毫克(布明信鹽酸鹽))

成分名稱 [衛生署資料]

系統對照名稱

BROMHEXINE HCL

該成分未收錄a039304100 ESTROMON F.C. TABLETS 0.625MG "STANDARD" ("生達"伊使蒙膜衣錠0.625公絲)

成分名稱 [衛生署資料]

系統對照名稱

ESTROGEN CONJUGATED

Conjugated Estrogens

a043493345 FLURBI PAP "D.S." (非比樂膠布"德山") _ [非內用藥品]

成分名稱 [衛生署資料]

系統對照名稱

FLURBIPROFEN

Flurbiprofen

a045960435 SINOMIN OPHTHALMIC SOLUTION (止癢點眼液)

成分名稱 [衛生署資料]

系統對照名稱

SULFAMETHOXAZOLE

Sulfamethoxazole

b006049100 SECTRAL 400 MG FILM-COATED TABLETS (心施德膜衣錠400毫克)

成分名稱 [衛生署資料]

系統對照名稱

ACEBUTOLOL HCL

Acebutolol

b022417435 QUINAX STERILE OPHTHALMIC SOLUTION (快納史眼藥水)

成分名稱 [衛生署資料]

系統對照名稱

AZAPENTACENE POLYSULFONATE SODIUM

該成分未收錄b023109100 CO-DIOVAN 80/12.5 FILM COATED TABLETS (可得安穩 80?12.5 膜衣錠)

成分名稱 [衛生署資料]

系統對照名稱

VALSARTAN

Valsartan

HYDROCHLOROTHIAZIDE (EQ TO 3,4-DIHYDROCHLOROTHIAZIDE)

Hydrochlorothiazide

病人主訴

- ◆因還是很不舒服所以請醫師換成原本之前開立的co-diovan80/12.5mg
- ◆並多開立bisolvon8mg改善痰液多的問題
- ◆膝關節疼痛止痛貼布也了, GLUCOSAMIN也吃了還是沒改善 有沒有更有效?

藥師處置

- ◆ 多喝開水使痰變稀且黏稠度降低，可藉著咳嗽排出。
- ◆ 膝關節疼痛建議每天熱敷改善血液循環並建議看骨科
- ◆ 荷爾蒙的補充，應在醫師的監控下使用定期做乳房、子宮頸檢查(很重要)

更年期如何保健？

- ◆ 生理方面：
 1. 均衡的飲食,保持良好生活習慣：可減低患骨質疏鬆症、冠心病等機會；且避免菸、酒及含咖啡因飲料。
 2. 增加鈣質攝取 飲食宜清淡，少吃過鹹或是油膩食物，尤其是飽和脂肪酸，容易使血管硬化阻塞，應盡量避免。
 3. 規律的運動：運動不足，骨質流失快。
 4. 適度的戶外運動與日曬：陽光能幫助身體產生維他命D
 5. 定期健康檢查：每年一次子宮頸抹片檢查，每月一次自我乳房檢查，以及早查覺疾病。

今日分享

病人的用藥反應

藥品與保健食品的搭配服用問題

參考資料

行政院衛生署藥品交互作用資料庫查詢系統

KiingNet國家網路醫院

