


個案基本資料

- 姓名：陳○○
- 性別：男
- 年齡：85歲
- 語言：國、台語
- 教育程度：國小畢
- 身高：148公分 體重：39公斤
BMI:17.8
- 進食方式：由口進食
- 認知能力：心智功能完好



個案基本資料

- 使用輔具：單手拐杖
- 近三個月跌倒次數：1次
 跌倒原因：個案身體因素
- 主要照顧者：女兒
- 家庭支持狀況：與配偶、女兒同住。
- 藥物過敏紀錄：無
- 開刀史：無



舊有疾病史

- 高血壓
- 心臟病
- 骨關節炎



藥品	劑量	成分	用法用量	4/3~5/31	6/1~8/10
Blopress	8mg	Candesartan	1# QD	██████████	DC
Isomil	40mg	Verapamil	1# BID	██████████	DC
Concor	1.25mg	Bisoprolol	1# QD	██████████	DC
Diltisser	30mg	Diltiazem	1# QID	██████████	改BID
MgO	250MG	MgO	1# QD	██████████	改TID
Bokey	100mg	Aspirin	1# QD	██████████	██████████
Pletaal	100mg	Cilostazol	1# QDAC	██████████	██████████
Cozaar	100 mg	Losartan	0.5# QD	██████████	██████████
Furide	40mg	Furosemide	0.5# QOD	██████████	██████████
Lanoxin	0.25mg	Digoxin	0.5# QOD	██████████	██████████
Propranolol	10mg	Propranolol	0.5# BID	██████████	██████████
Ceretal	400mg	Pentoxifylline	1# BID	██████████	██████████
MgO	250MG	MgO	1# TID	██████████	██████████
Diltisser	30mg	Diltiazem	1# BID	██████████	██████████

用藥問題1 (第一次訪視)

- S：個案反應常有頭暈現象發生，加入Isomil後頭暈現象加深。
- O：Diltisser(30)1# qid, Isomil(40)1# bid, Pletaal(100)1# qd.
- A：發生頭暈的或然率
Diltisser(3.5%~6.4%), Isomil(3.0%~5.9%), Pletaal(9%~10%)
- P：Diltisser and Isomil同屬鈣離子阻斷劑且同時也可block AV node conduction,故在訪視時建議如果醫師要同時併用，建議先將Diltisser改為1# tid and Isomil改為qd使用。可以的話建議將Isomil DC可減少頭暈不良反應的發生。
- F：第二次訪視時，個案已由另一心內醫師開立處方，將Isomil DC且將Diltisser(30)改為1# bid使用。

結果：個案頭暈現象改善良多，但仍舊有偶有輕微頭暈現象。



用藥建議1 (第一次訪視)

O : Bokey(100)1# qd,Pletaal(100)1# qd.

A : 兩者同屬抗血小板凝集劑。

P : 兩藥同時併用對抗血小板凝集會有加乘作用，建議家屬注意個案是否有發生不正常出血現象(解黑便、異常頭痛)，再回診就醫前，一旦發生建議可先**hold Pletaal**。

衛教：建議在手術或拔牙前，請事先告知您的醫師或牙醫，您正服用此二藥。



用藥建議2 (第一次訪視)

O : Bokey(100)1# qd,MgO(250)1# qd.

A : 兩藥有交互作用

Severity: moderate Onset: delayed
Substantiation: theoretical

P : 同時使用此二藥會減低salicylate
血清濃度及造成Bokey腸溶劑型提早崩
散，建議兩藥間隔至少1小時以上服用。



用藥問題1 (第二次訪視)

- O：目前服用**Ceretal(400)1# bid**.
- A：家屬經由與醫師討論後，醫師說可以減半服用，家屬隨之改為**0.5# bid**服用，但此藥為持續性釋放藥品，需整粒吞服不可撥半服用。
- P：建議家屬如果減半服用，但個案長期有胃部不適現象，建議改為**1# hs**服用。但仍注意個案睡眠狀態是否會有中斷現象或不容易入睡情形發生。
- F：家屬目前改為**1# QDPC**立刻使用。

用藥問題2 (第二次訪視)

- O：目前服用**Concor(1.25) 1# qd and Propranolol(10) 0.5# bid**.
- A：此二藥品分別為**selective beta 1 blocker and nonselective beta blocker**,皆有降壓及減低心跳的作用，唯此次就診發現個案有**CHF**病症故加入**Digoxin and Furoside**同時控制該疾病。而服用**Concor**對於血壓及心跳顯現有較佳的控制果。
- P：建議家屬回診時跟醫師溝通是否仍有同時使用**Propranolol**的必要性，如非必需建議**DC**。
- F：回診時家屬告知醫師個案使用**Propranolol**有較好的控制，故醫師**DC Concor**.且在個案心跳過快時增加一次服用。

用藥建議1 (第二次訪視)

O : Digoxin(0.25)0.5# qod,Furide(40)0.5#
qod,Cozaar(100)0.5# qd and
Diltisser(30)1# bid.

BP:110~130/70~85,HR:110~123次/分

A : diltiazem與digoxin有交互作用會使
digoxin濃度上升；furosemide為保鉀利尿
劑及losartan為保鉀ARBs.

P : 密切監測個案血中鉀離子濃度及digoxin血中濃
度，避免中毒現象發生。

衛教：治療濃度[Digoxin]：0.8 to 2 ng/mL

中毒症狀：噁心、嘔吐、視力模糊(呈現黃色視覺)、
呼吸困難。

