

99年度社區藥局 用藥照護個案報告

建興藥局 李秉鴻

個案基本資料

- 姓名：魏先生
- 性別：男
- 生日：民國18年9月21日
- 身高：170公分
- 體重：70公斤
- BMI：24.22

個案基本資料

- 教育程度：高中畢業
- 家庭狀況：有一男兩女，目前與太太和二女兒同住
- 經濟來源：子女供養，平日有向社會局申請兩位社工人員料理三餐
- 是否有身心障礙手冊：沒有
- 常用語言：台語

健康狀況

- 意識狀態：清醒
- 皮膚狀況：正常
- 目前飲食狀態：一般飲食
- 進食方式：由口進食
- 行動方式：可下床活動或離開輪椅，但無法自由走動

健康狀況

- 疾病史：中風、高血壓、糖尿病
- 溝通：
 - 1.視力：左右眼皆模糊
 - 2.聽力：清晰
 - 3.說話：僅可表達簡單的句子
 - 4.理解能力：僅可理解間單的句子
- 使用輔具：助行器、輪椅

用藥紀錄

99/3/15第一次訪視

醫療院所：林口長庚

醫師處方藥品：11項

編號	商品名	學名	含量	劑量/用法
1	BOKEY	ASPIRIN	100MG	1# / QD
2	COAPROVEL	IRBESARTAN HYDROCHLOROT HIAZIDE	150MG 12.5MG	1# / QD
3	TRENFYLLINE	PENTOXIFYLLINE	400MG	1# / BID
4	ACTOS	PIOGLITAZONE	30MG	1# / QD
5	AMARYL	GLIMEPIRIDE	2MG	1.5# / BID

用藥紀錄

編號	商品名	學名	含量	劑量/用法
6	BLASEC	OXYBUTYNIN	2.5MG	1# / QID
7	DILATREND	CARVEDILOL	6.25MG	0.5# / BID
8	GLIBUDON	METFORMIN	500MG	1.5# / BID
9	NOOPOL	PIRACETAM	1200MG	1# / QD
10	PK-MERZ	AMANTADINE	100MG	1# / BID
11	NORVASC	AMLODIPINE	5MG	1# / BID

非醫師處方藥品或保健食品：0項







用藥相關問題

商品名	學名	含量	劑量/用法
NORVASC	AMLODIPINE	5MG	1# / BID
用藥相關問題	相關問題發生原因	藥師建議	
CJ 潛在不良反應 (腳踝嚴重水腫)	DI 腎功能不佳	EG 停藥	

用藥紀錄

99/3/15第二次訪視

醫療院所：林口長庚

醫師處方藥品：10項

編號	商品名	學名	含量	劑量/用法
1	BOKEY	ASPIRIN	100MG	1# / QD
2	COAPROVEL	IRBESARTAN HYDROCHLOROT HIAZIDE	150MG 12.5MG	1# / QD
3	TRENFYLLINE	PENTOXIFYLLINE	400MG	1# / BID
4	ACTOS	PIOGLITAZONE	30MG	0.5# / QD
5	AMARYL	GLIMEPIRIDE	2MG	1# / TID

用藥紀錄

編號	商品名	學名	含量	劑量/用法
6	BLASEC	OXYBUTYNIN	2.5MG	1# / QID
7	DILATREND	CARVEDILOL	6.25MG	1# / QD
8	GLIBUDON	METFORMIN	500MG	1# / TID
9	NOOPOL	PIRACETAM	1200MG	1# / QD
10	PK-MERZ	AMANTADINE	100MG	1# / BID

非醫師處方藥品或保健食品：0項



用藥紀錄

99/3/15第三次訪視

醫療院所：林口長庚

醫師處方藥品：10項

編號	商品名	學名	含量	劑量/用法
1	BOKEY	ASPIRIN	100MG	1# / QD
2	COAPROVEL	IRBESARTAN HYDROCHLOROT HIAZIDE	150MG 12.5MG	1# / QD
3	TRENFYLLINE	PENTOXIFYLLINE	400MG	1# / BID
4	ACTOS	PIOGLITAZONE	30MG	0.5# / QD
5	AMARYL	GLIMEPIRIDE	2MG	1.5# / BID

用藥紀錄

編號	商品名	學名	含量	劑量/用法
6	BLASEC	OXYBUTYNIN	2.5MG	1# / QID
7	DILATREND	CARVEDILOL	6.25MG	0.5# / BID
8	LODITON	METFORMIN	500MG	1.5# / BID
9	NOOPOL	PIRACETAM	1200MG	1# / QD
10	PK-MERZ	AMANTADINE	100MG	1# / BID

用藥紀錄

非醫師處方藥品或保健食品：3項

使用動機	商品名	學名	含量	劑量/用法
膝蓋、關節疼痛	外國品牌	GLUCOSAMINE CHONDROITIN MSM(Methylsulfonylmethane)	1500MG 800MG 750MG	1# / QD
膝蓋、關節疼痛	外國品牌	GLUCOSAMINE MSN(Methylsulfonylmethane)	1500MG 1500	1# / QD
補充營養	Silver Centrum		綜合維他命	1# / QD





用藥相關問題

商品名	學名	含量	劑量/用法
外國品牌	GLUCOSAMINE CHONDROITIN MSM(Methylsulfonylmethane)	1500MG 800MG 750MG	1# / QD
外國品牌	GLUCOSAMINE MSN(Methylsulfonylmethane)	1500MG 1500	1# / QD

用藥相關問題

用藥相關問題	相關問題發生原因	藥師建議
CB 重複用藥	DE 藥品作用相同	EI 更改劑量 (兩樣擇一服用)
CB 重複用藥	DE 藥品作用相同	EI 更改劑量 (兩樣擇一服用)

NORVASC®脈優

- 成分：AMLODIPINE BESYLATE 5MG
10MG
- 作用機轉：Calcium Channel Blockers(CCBs)，鈣離子阻斷劑。抑制鈣離子穿過細胞膜進入心臟及血管平滑肌肉。使心臟收縮力降低、冠狀動脈擴張、末梢小動脈擴張。
- 適應症：高血壓、心絞痛。


NORVASC®脈優不良反應

- 輕度至中度周邊水腫是臨床試驗中最常見的不良反應
- 最常見的不良反應與劑量相關的發生率：

不良反應	2.5公絲 (n=275)	5.0公絲 (n=296)	10.0公絲 (n=268)	安慰劑 (n=520)
水腫	1.8	3.0	10.8	0.6
暈眩	1.1	3.4	3.4	1.5
潮紅	0.7	1.4	2.6	0.0
心悸	0.7	1.4	4.5	0.6

資料來源：輝瑞脈優仿單

CCBs / ARBs or ACEI 的互補療效： 減低與CCBs有關的水腫



CCBs

- 造成動脈血管擴張的降血壓作用
- 造成缺乏靜脈舒張的水腫傾向
- 血壓下降會刺激腎素血管收縮素系統並增加血管收縮素 II 的濃度

CCBs + ARBs or ACEI


- 阻斷腎素血管收縮系統，會抑制血管收縮素 II 的作用，並額外減低血壓
- ARBs or ACEI 引起的血管舒張作用可減低水腫

BHS/NICE-2006 HT Guidelines

Abbreviations :

- A = ACE inhibitor (consider angiotensin -II receptor antagonist if ACE intolerant)
- C = Calcium-Channel Blocker
- D = Thiazide-type Diuretic

Black patients are those of African or Caribbean descent · and not mixed-race · Asian or Chinese patients



J Renin Angiotensin Aldosterone Syst 2006;7;61

~感謝聆聽 THX